

Атлас мышц для применения препарата Диспорт®

Базовое руководство по дозированию и введению препарата Диспорт® при фокальной спастичности, цервикальной дистонии, блефароспазме и гемифациальном спазме у взрослых¹


Оптимальная дозировка жизненно важна для достижения длительного облегчения симптомов при применении препарата по всем показаниям.

В данном руководстве показаны рекомендуемые дозы и количество мест введения для каждой целевой мышцы или группы мышц.

Рекомендуется использование методов контроля введения, таких как электромиография, электростимуляция или УЗИ.

Обратите внимание, что в одну точку может быть введено не более 1 мл раствора.

Зеленые значки обозначают расположение конкретной мышцы, а не точное место введения препарата.



- Блефароспазм и гемифациальный спазм у взрослых.** Максимальная вводимая доза не должна превышать **общую дозу 120 ЕД** на глаз.
 - Цервикальная дистония у взрослых.** Начальная суммарная разовая доза препарата для лечения цервикальной дистонии составляет **500 ЕД** и распределяется между 2-3 наиболее активными мышцами. При последующем назначении, рекомендуемые суммарные дозы находятся в пределах от 250 до 1000 ЕД. Снижение дозы препарата возможно при значимом дефиците массы тела пациента или у лиц пожилого возраста со сниженной мышечной массой тела.
 - Фокальная спастичность верхних конечностей у взрослых.** Максимальная суммарная разовая доза не должна превышать **1000 ЕД**. Количество точек для инъекций зависит от объема мышц, в которые будут вводиться инъекции.
 - Фокальная спастичность нижних конечностей у взрослых.** В течение одного сеанса лечения можно вводить внутримышечно дозу до **1500 ЕД**.
 - Фокальная спастичность верхних и нижних конечностей у взрослых.** В случае необходимости лечения спастичности верхних и нижних конечностей во время одного сеанса лечения, доза препарата Диспорт® для инъекций в каждую конечность должна быть адаптирована к индивидуальным потребностям, не должна превышать суммарной дозы **1500 ЕД**.
- Обозначение:
Количество точек для инъекции

Состав:
Диспорт® (протономинация наценки) в стеклянной ампуле, 300 ЕД и 500 ЕД.

Фармакологическая группа: миорелаксант периферического действия.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

Состав:
Действующее вещество: один флакон содержит ботулинический токсин типа А (свалентный комплекс), 300 ЕД и 500 ЕД.

Вспомогательные вещества: альбумин человека — 125 мг, лактозы моногидрат — 2,5 мг.

Показания к применению (неврологические показания):
Спастическое лечение фокальной спастичности верхних и нижних конечностей у взрослых и детей в возрасте 2 и лет или старше.

- Цервикальная дистония у взрослых.
- Блефароспазм у взрослых.
- Гемифациальный спазм у взрослых.

Противопоказания:
Диспорт® противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:
Фокальная спастичность верхних конечностей у взрослых: максимальная суммарная разовая доза не должна превышать 1000 ЕД.
Фокальная спастичность нижних конечностей у взрослых: максимальная суммарная разовая доза не должна превышать 1500 ЕД.
Фокальная спастичность верхних и нижних конечностей у взрослых: в случае необходимости лечения спастичности верхних и нижних конечностей в одну сессию лечения доза не должна превышать 2000 ЕД.
Фокальная спастичность верхних конечностей у детей и взрослых 2 и лет или старше: максимальная доза препарата Диспорт® вводится во время инъекционной сессии в одну верхнюю конечность, не должна превышать 15 ЕД на одну конечность или 30 ЕД на каждую конечность в совокупности. Для введения препарата в обе верхние конечности, максимальная доза препарата Диспорт® не должна превышать 21 ЕД на одну или 30 ЕД на каждую конечность.
Фокальная спастичность нижних конечностей у детей и взрослых 2 и лет или старше: общая максимальная доза препарата Диспорт® вводится во время инъекционной сессии в одну нижнюю конечность, не должна превышать 15 ЕД на одну конечность или 30 ЕД на каждую конечность в совокупности. Для введения препарата Диспорт® на каждую нижнюю конечность, максимальная доза препарата Диспорт® не должна превышать 21 ЕД на одну или 30 ЕД на каждую конечность.
Фокальная спастичность верхних и нижних конечностей у детей и взрослых 2 и лет или старше: в случае необходимости лечения спастичности верхних и нижних конечностей в одну сессию лечения, доза препарата Диспорт® на одну сессию не должна превышать 30 ЕД на одну или 300 ЕД на каждую конечность.
Цервикальная дистония у взрослых: начальная суммарная разовая доза препарата составляет 500 ЕД. Доза препарата Диспорт® должна быть разделена на несколько инъекций. При последующем назначении дозы могут варьироваться в пределах от 250 до 1000 ЕД. Максимальная суммарная разовая доза не должна превышать 1000 ЕД.

Блефароспазм и гемифациальный спазм у взрослых: начальная доза препарата Диспорт® для лечения блефароспазма составляет 40 ЕД на каждый глаз. Максимальная доза для лечения блефароспазма и гемифациального спазма не должна превышать 120 ЕД на каждый глаз. Пациентам с гемифациальным спазмом лечат так же, как пациентам с спастическим блефароспазмом.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:
Общие для всех показаний и препаратов: астения, утомляемость, триптофаный синдром, боль/неприятно в месте введения.
При симптоматическом лечении фокальной спастичности верхних конечностей у взрослых: мышечная слабость, снижение мышечной силы, боль в конечностях, астения, утомляемость, триптофаный синдром, головная боль в месте введения.
При симптоматическом лечении фокальной спастичности нижних конечностей у взрослых: мышечная слабость, астения, утомляемость, триптофаный синдром, реакция в месте введения, депрессия, падение.
При симптоматическом лечении фокальной спастичности верхних конечностей у детей и взрослых 2 и лет или старше: мышечная слабость, боль в конечностях, триптофаный синдром, астения, утомляемость, головная боль в месте введения, ощущение онемения.
При симптоматическом лечении фокальной спастичности нижних конечностей у детей и взрослых 2 и лет или старше: мышечная слабость, астения, утомляемость, триптофаный синдром, реакция в месте введения, нарушение походки, утомляемость, падение.
При лечении цервикальной дистонии у взрослых: головная боль, головокружение, парез лицевых нервов, нечеткость зрения, снижение аппетита, бронхит, диарея, диспепсия, боль в шее, снижение мышечной силы, миалгия, боль в конечностях, снижение мышечной силы/слабость, диспепсия, сухость во рту, мышечная слабость (очень редко).

При лечении блефароспазма и гемифациального спазма у взрослых: парез лицевого нерва, опух (очень редко), диплопия, сухость глаз, повышение слезоотделения, отек век.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Лечение препаратом должно проводиться специалистами, имеющими опыт в диагностике и лечении подобных состояний, и проводящим подготовку по применению препарата.

С осторожностью следует вводить Диспорт® больным с нарушениями функции стояния и движения, так как данные нарушения могут быть результатом дисбаланса мышечной силы/слабости в сочетании с дисбалансом мышечной силы. Следует с осторожностью использовать препарат у пациентов с нарушениями функции стояния и движения. Не рекомендуется превышать рекомендованные дозы и частоты введения препарата Диспорт®. Диспорт® не следует применять у пациентов с дисбалансом мышечной силы/слабости. С особой осторожностью следует повторно вводить препарат пациентам, у которых отмечены апатерические реакции на предыдущий инъекционный препарат. В случае развития апатерических реакций дальнейшее применение препарата должно осуществляться после оценки соотношения польза/риск от лечения для пациента.

Примечание: при назначении препарата Диспорт® следует учитывать, что единицы действия препарата являются специфическими и не могут сравниваться с таковыми других препаратов, содержащих ботулинический токсин.

Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.

ООО «Ипсен»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2, каб. 10-27, 30-30 41-14; тел. +7 (495) 258-54-00; факс +7 (495) 258-54-01; www.ipсен.ru.
Материал предназначен для специалистов здравоохранения.

Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рабочие часы): телефон по применению; тел. 8 (800) 700-40-25 (бесплатный номер телефона по всей Российской Федерации); электронная почта: Medical.Support@ipсен.ru; CS@ipсен.ru.

Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакциях: для пациентов на лечение препаратом: компания: +7 (915) 999-30-28 (круглосуточно); электронная почта: rpharm@ipсен.ru; ipсен@ipсен.ru.
DYSNE-RU-00677 - 02/2021