

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ®



Референтный (оригинальный) препарат¹



Противоишемическое действие,
антигипоксанта́ный, антиоксидантный
и мембраностабилизирующий эффекты^{2,3,4}



Инъекционная и таблетированная лекарственные
формы для проведения последовательной терапии
в целях максимального раскрытия потенциала препарата^{5,6,7}



Возможность использования максимальной суточной дозировки
при парентеральном введении и приеме per os^{5,6,8}



Мексидол® ФОРТЕ 250 – единственный препарат с действующим
веществом этилметилгидроксипиридина сукцинат с двойной
дозировкой – 250 мг в лекарственной форме для приема per os!⁹



Аркагий
Петрович,
50 лет

Строитель,
любит рыбалку
и смотреть
телевизор,
всегда
с нетерпением
ждет прихода
внука.
Курильщик
со стажем.

МЕКСИДОЛ®
Этилметилгидроксипиридина сукцинат

ДИАГНОЗ:

Ранний восстановительный
период после перенесенного
полушарного ишемического
инсульта (периферический
парез, синдром игнорирования
[неглекта], сосудистые
когнитивные нарушения).

**Мексидол® – противоишемический препарат, ускоряющий процесс
восстановления и способствующий более полной реабилитации пациентов
после ишемического инсульта в раннем восстановительном периоде.**^{1,2,3}

Мексидол® (этилметилгидроксипиридина сукцинат) входит в:

- » Стандарт скорой медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, Приказ МЗ РФ от 05.07.2016 № 466н
- » Стандарт специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга, Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 № 1740н
- » Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками, 2015
- » Клинические рекомендации «Диагностика и тактика при инсульте в условиях общей врачебной тактики, включая первичную и вторичную профилактику», 2013
- » Инсульт. Руководство для врачей под редакцией Стаховской Л.В., Котова С.В., 2-е издание, Москва, 2018
- » Методические рекомендации «Лечение и реабилитация больных в восстановительном и резидуальном периодах инсульта» под редакцией Кадыкова А.С., Шахпаронова Н.В., 2-е издание, Москва, 2017

ООО «ВЕКТОРФАРМ»
дистрибьютор лекарственных препаратов
ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»
 **ФАРМАСОФТ**

¹ Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. письмо № 7375 ФГБУ «НЦЭСМП» Министерства здравоохранения РФ от 08.05.2018 г.; письмо № 8795 ФГБУ «НЦЭСМП» Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2018 г. 2. Погорель В.Е., Арпвт А.В., Гаевый М.Д. с соавт. Экспериментальная и клиническая фармакология, 1999, Том 62, № 5, стр. 15-17. 3. Нечипуренко Н.И., Василевская Н.А. с соавт. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2006, Приложение 1. 4. Воронина Т.А. Мексидол: спектр фармакологических эффектов. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2012; 12: с. 86-90. 5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Мексидол®, раствор для в/в и в/м введения, 50 мг/мл, Р N002161/01 от 14.03.2008 г., дата переоформления 22.01.2019 г. 6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Мексидол®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, ЛСР-002063/07 от 09.08.2007 г., дата переоформления 06.03.2019 г. 7. Стаховская Л.В., Шамалов Н.А., Хасанова Д.Р., Мельникова Е.В. с соавт. Результаты рандомизированного двойного слепого мультицентрового плацебо-контролируемого в параллельных группах исследования эффективности и безопасности мексидола при длительной последовательной терапии у пациентов в остром и раннем восстановительных периодах полушарного ишемического инсульта (ЭПИКА). Журнал неврологии и психиатрии, 2017; 3 (2): 55-64. 8. Инструкция по медицинскому применению лекарственных препаратов с группировочным наименованием: этилметилгидроксипиридина сукцинат. Источники информации: Государственный реестр лекарственных средств, www.grls.rosminzdrav.ru, на 30.05.2017 г. 9. Инструкция по медицинскому применению препаратов с группировочным наименованием: этилметилгидроксипиридина сукцинат в лекарственной форме для приема per os. Источники информации: Государственный реестр лекарственных средств, www.grls.rosminzdrav.ru, на 26.11.2018 г. 10. Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, распоряжение Правительства РФ № 2738-р от 10.12.2018.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ® РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ Регистрационный номер: Р N002161/01 от 14.03.2008, дата переоформления 22.01.2019 г. Торговое наименование: Мексидол®. Группировочное название: этилметилгидроксипиридина сукцинат. Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Состав: Действующее вещество – этилметилгидроксипиридина сукцинат – 50 мг. Вспомогательные вещества: натрия метабисульфит, вода для инъекций. Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость. Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство. Код АТХ: N07XX. Показания к применению: ОНМК; ЧМТ, последствия ЧМТ; Дисциркуляторная энцефалопатия; Синдром вегетативной дисфункции; Легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; Тревожные расстройства при невротических и невротоподобных состояниях; Острый инфаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной терапии; Первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; Кулирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием невротоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; Острая интоксикация антипсихотическими средствами; Острые гнойно-воспалительные процессы брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) в составе комплексной терапии. Противопоказания: острые нарушения функции печени и почек, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Мексидол® у детей, при беременности и кормлении грудью не проводилось. Способ применения и дозы: в/м или в/в (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить в 0,9 % растворе натрия хлорида. Струйно Мексидол® вводят медленно в течение 5-7 мин, капельно – со скоростью 40-60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг. При ОНМК Мексидол® применяют в первые 10-14 дней – в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки, затем в/м по 200-250 мг 2-3 раза в сутки в течение 2 недель. При ЧМТ и последствиях ЧМТ Мексидол® применяют в течение 10-15 дней в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки. При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Мексидол® следует назначать в/в струйно или капельно в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки на протяжении 14 дней. Затем в/м по 100-250 мг/сут на протяжении последующих 2 нед. Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводят в/м в дозе 200-250 мг 2 раза в сутки на протяжении 10-14 дней. При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах препарат применяют в/м в суточной дозе 100-300 мг/сут на протяжении 14-30 дней. При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии Мексидол® вводят внутривенно или внутримышечно в течение 14 суток, на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда, включающей нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), тромболитики, антиагрегантные и антиагрегантные средства, а также симптоматические средства по показаниям. В первые 5 суток, для достижения максимального эффекта, препарат желательно вводить внутривенно, в последующие 9 суток Мексидол® может вводиться внутримышечно. Внутривенное введение препарата производят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов) на 0,9 % растворе натрия хлорида или 5 % растворе декстрозы (глюкозы) в объеме 100-150 мл в течение 100-150 мин. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут. Введение препарата (внутривенное или внутримышечное) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 часов. Суточная терапевтическая доза составляет 6-9 мг/кг массы тела в сутки, разовая доза – 2-3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая – 250 мг. При открытоугольной глаукоме различных стадий в составе комплексной терапии Мексидол® вводят внутримышечно по 100-300 мг/сутки, 1-3 раза в сутки в течение 14 дней. При абстинентном алкогольном синдроме Мексидол® вводят в дозе 200-500 мг в/в капельно или в/м 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней. При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводят в/в в дозе 200-500 мг/сут на протяжении 7-14 дней. При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначают в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационном периоде. Вводимые дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмена препарата должна производиться постепенно только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта. При остром отечном (интерстициальном) панкреатите Мексидол® назначают по 200-500 мг 3 раза в день, в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) и в/м. Легкая степень тяжести некротического панкреатита – по 100-200 мг 3 раза в день в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) и в/м. Средняя степень тяжести – по 200 мг 3 раза в день, в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида). Тяжелое течение – в пульс-дозировке 800 мг в первые сутки, при двукратном режиме введения, далее по 200-300 мг 2 раза в день с постепенным снижением суточной дозы. Крайне тяжелое течение – в начальной дозировке 800 мг/сут до стойкого купирования проявлений панкреатогенного шока, по стабилизации состояния по 300-500 мг 2 раза в день в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозировки. Побочные действия: возможно появление тошноты и сухости слизистой рта, сонливости, аллергических реакций. Взаимодействие: усиливает действие бензодиазепиновых анксиолитиков, противосудорожных средств (карбамазепина), противопаркинсонических средств (леводопы). Уменьшает токсические эффекты этилового спирта. Особые указания: в отдельных случаях, особенно у предрасположенных пациентов с бронхиальной астмой при повышенной чувствительности к сульфатам, возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности. Передозировка: при передозировке возможно развитие сонливости. Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии: ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», 115407, Россия, Москва, Судостроительная ул., д. 41, этаж 1, пом. 12. Тел./факс: +7 (495) 626-47-55.


КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ® ФОРТЕ 250, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ Регистрационный номер: ЛП-004831 от 26.04.2018, дата переоформления 24.01.2019 Торговое наименование: Мексидол® ФОРТЕ 250. Группировочное название: Этилметилгидроксипиридина сукцинат. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав: на 1 таблетку: Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат в пересчете на 100 % вещество – 250,0 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, повидон К-30, магния стеарат. Пленочная оболочка: Опадрай II розовый 33G240018 (гипромеллоза, титана диоксид, лактозы моногидрат, макрогол 4000, триацетин, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый). Описание: крупные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-розового цвета. На поперечном разрезе ядро почти белого цвета. Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство. Код АТХ: N07XX. Показания к применению: Последствия ОНМК, в том числе после транзиторных ишемических атак, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов; Легкая ЧМТ, последствия ЧМТ; Энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные); Синдром вегетативной дисфункции; Легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; Тревожные расстройства при невротических и невротоподобных состояниях; Ишемическая болезнь сердца в составе комплексной терапии; Кулирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием невротоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств, постабстинентные расстройства. Состояния после острой интоксикации антипсихотическими средствами. Астенические состояния, а также для профилактики развития соматических заболеваний под воздействием экстремальных факторов и нагрузок. Воздействие экстремальных (стрессорных) факторов. Способ применения и дозы: внутрь, по 250 мг 3 раза в сутки. Начальная доза – 250 мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки с постепенным повышением до терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза – 750 мг (3 таблетки). Длительность лечения – 2-6 недель; для купирования алкогольной абстиненции – 5-7 дней. Продолжительность курса терапии у больных ишемической болезнью сердца не менее 1,5-2 месяцев. Повторные курсы (по рекомендации врача), желательно проводить в весенне-осенние периоды. Противопоказания: острые нарушения функции печени и почек, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. В связи с недостаточным изученностью действия препарата – детский возраст, беременность, грудное вскармливание. Побочное действие: возможно появление индивидуальных побочных реакций: диспептического или диспепсического характера, аллергических реакций. Условия отпуска: отпускают по рецепту. Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», 115407, Россия, Москва, Судостроительная ул., д. 41, этаж 1, пом. 12. Тел./факс: +7 (495) 626-47-55.

ООО «Векторфарм», 109544, Москва, Бульвар Энтузиастов дом 2, этаж 16, комната 31, тел: +7 (495) 626-47-50


ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Преимущества сочетания препарата Мексидол® с базовой терапией:



Мексидол® – восстановление 97 % пациентов после инсульта (0-2 балла по модифицированной шкале Рэнкина) ¹



Качество жизни у пациентов в группе терапии препаратом Мексидол® на момент окончания лечения ¹



Мексидол® достоверно улучшает результаты реабилитации пациентов после инсульта ^{2,3}



Последовательная терапия препаратами Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 250 ^{1,2}

Мексидол®, раствор для в/в или в/м введения, 50 мг/мл, по 5-10 мл в день



Мексидол® ФОРТЕ 250, по 1 таблетке 250 мг 3 раза в день



Последовательная и полная терапия необходима для максимального раскрытия потенциала препарата ^{1,2}

¹ Стаховская Л.В., Шамалов Н.А., Хасанова Д.Р., Мельникова Е.В. с соавт. Результаты рандомизированного двойного слепого мультицентрового плацебо-контролируемого в параллельных группах исследования эффективности и безопасности мексидола при длительной последовательной терапии у пациентов в остром и раннем восстановительных периодах полушарного ишемического инсульта (ЭПИКА). Журнал неврологии и психиатрии, 2017; 3 (2):55-64. ² «Особенности реабилитации пациентов после инсульта», Ковальчук В.В., ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2012; вып. 2. ³ «Влияние мексидола на неврологический дефицит, социально-бытовую адаптацию и синдромы неглекта и «отталкивания» у пациентов после инсульта», Ковальчук В.В., ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 12, 2011; вып. 2

¹ Стаховская Л.В., Шамалов Н.А., Хасанова Д.Р., Мельникова Е.В. с соавт. Результаты рандомизированного двойного слепого мультицентрового плацебо-контролируемого в параллельных группах исследования эффективности и безопасности мексидола при длительной последовательной терапии у пациентов в остром и раннем восстановительных периодах полушарного ишемического инсульта (ЭПИКА). Журнал неврологии и психиатрии, 2017; 3 (2):55-64. ² Щепанкевич Л.А., Николаев Ю.А., Долгова Н.А. Оптимизация липидснижающей терапии у пациентов с ишемическим инсультом и сахарным диабетом 2-го типа. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2016; 2: с. 42-45.