

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

АМБЕНЕ[®] БИО

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



КОРОТКИЙ КУРС
10  ИНЪЕКЦИЙ¹

ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ⁴ | 6 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ БОЛИ



ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ
РАСТВОР С ТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА (100 МГ В 1 МЛ)¹



ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ
ЗА СЧЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩЕННОГО
ОТ ПРИМЕСЕЙ СОСТАВА²



**СИНЕРГИЯ ЧЕТЫРЕХ КОМПОНЕНТОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ –**
УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ, УЛУЧШЕНИЕ
ФУНКЦИЙ СУСТАВОВ, ЗАМЕДЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ОСТЕОАРТРОЗА²



ЛУЧШЕ ДОСТУП К ПОРАЖЕННОЙ ТКАНИ
ПЕПТИДЫ НЕБОЛЬШОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО
ВЕСА (300-600ДА)²

Симптомы ОА³

боль
нарушение
функций

Патогенез ОА³

воспаление
деструкция хряща
апоптоз хондроцитов
и прогрессирование ОА

АМБЕНЕ®БИО — патогенетическая терапия^{2,4}

✓ способствует
уменьшению
симптомов

✓ действует
на патогенез
остеоартрита

АМБЕНЕ®БИО — синергия четырех компонентов для патогенетической терапии ОА^{2,4}

ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТ

- восстановление хрящевой ткани
- купирование воспаления
- уменьшение боли
- замедление прогрессирования

МИКРО- и МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

- нормализация хрящевого матрикса



АМИНОКИСЛОТЫ

- синтез новых
компонентов
хрящевой ткани

ПЕПТИДЫ

- регенерация
хрящевой ткани

АМБЕНЕ®БИО — предотвращает апоптоз хондроцитов и замедляет прогрессирование ОА^{2,5}

БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ



Большое количество
клеток с апоптозом

ОА — остеоартрит




АМБЕНЕ®БИО



Клеток с апоптозом
практически не наблюдается

Всего 1 курс АМБЕНЕ®БИО избавит от боли на 6 месяцев⁴

Динамика выраженности болевого синдрома по ВАШ в покое



Уже после первого курса АМБЕНЕ®БИО наблюдается значимое уменьшение болевого синдрома в покое на 75%, причем положительные изменения сохраняются в течение последующих 6 месяцев^{2,4,6}

ВАШ — визуально-аналоговая шкала

Всего 1 курс АМБЕНЕ®БИО способствует улучшению функции суставов^{2,4}

Динамика оценки состояния
крупных суставов по WOMAC



Динамика оценки состояния
мелких суставов по AUSCAN



Уже после первого курса АМБЕНЕ®БИО наблюдается значимое уменьшение скованности и улучшение функциональности. Эффект сохранялся в течение последующего наблюдения и демонстрировал дополнительную положительную динамику к концу исследования^{2,4,6}.

АМБЕНЕ® БИО: короткий курс лечения — длительный эффект^{1,2,4}

✓ Курс лечения —
10 инъекций¹



✓ Эффект —
6 месяцев без боли⁴



Сокращенная инструкция по применению препарата АМБЕНЕ® БИО

Регистрационный номер: ЛП-004183. **Торговое наименование:** Амбене® Био. **Лекарственная форма:** раствор для инъекций. **Состав на 1 мл:** экстракт концентрированный из мелкой морской рыбы — 0,1 г/мл, **вспомогательные вещества:** фенол — до 0,005 г/мл; вода для инъекций — до 1,0 мл. **Показания к применению:** • первичный и вторичный остеоартроз различной локализации (коксартроз, гонартроз, артроз мелких суставов); • остеохондроз и спондилез. **Противопоказания:** • повышенная чувствительность к компонентам препарата; • беременность и период лактации; • детский возраст. **С осторожностью:** не рекомендуется назначение препарата в юношеском возрасте из-за отсутствия научных клинических данных у этой категории пациентов. **Способ применения и дозы:** в/м (глубоко), внутрисуставно. В/м. При полиостеоартрозе и остеохондрозе — по 1 мл в день, курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней); или — по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 дней). Внутрисуставно. При преимущественном поражении крупных суставов — по 1–2 мл в каждый сустав с интервалом 3–4 дня. Всего на курс 5–6 инъекций в каждый сустав. Возможно сочетание внутрисуставного и в/м метода введения. Курс лечения целесообразно повторить через 6 мес после консультации врача. **Побочное действие:** см. инструкцию по медицинскому применению. **Форма выпуска:** 1 мл №10, 2 мл №5. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре 15–25 °С. **Условия отпуска:** Отпуск по рецепту.

Препарат АМБЕНЕ® БИО, ЛП-004183, дата регистрационного удостоверения 19.08.2020.

1. Инструкция по медицинскому применению препарата АМБЕНЕ® БИО. Для способа применения: по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций по 1 инъекции через день в течение 20 дней. **2.** Меньшикова И.В., Сорочкая В.И. Лечение остеоартроза крупных и мелких суставов с использованием инъекционного хондропротектора комплексного действия. Лечащий врач. 2021; 4(24). 54–59. **3.** Алексеева Л.И., Таскина Е.А., Кашеварова Н.Г. Остеоартрит: эпидемиология, классификация, факторы риска и прогрессирования, клиника, диагностика, лечение. Современная ревматология. 2019;13(2):9–21. <https://doi.org/10.14412/1996-7012-2019-2-9-21>. **4.** Данилов А.Б., Лила А.М., Фекистов А.Ю. Два взгляда на проблему остеоартрита и остеохондроза: сравнение подходов к терапии (пострелиз). РМЖ. 2021;7:74–78. **5.** Денисов Л.Н. и др. Остеоартрит-аспекты фармакотерапии // Современная ревматология. – 2018. – Т. 12. – №. 2. – С. 97–102. **6.** Отчет по результатам исследования «КОЛИБРИ», данные компании ООО ПРОМОМЕД ДМ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ



ООО ПРОМОМЕД ДМ
129090 Москва, Проспект Мира, 13, стр. 1
офис 106, тел. +7 (495) 640-25-28
www.promo-med.ru